

Reg. 060940

SENHOR

RELATORIO



DA

EPIDEMIA D'AVEIRO.

biBRIA



LISBOA:

NA IMPRESSÃO REGIA. ANNO 1833.

Por Ordem Superior.



RELATÓRIO

DA

EPIDEMIA D'AVÉIRO.

bibRIA



LISBOA:

NA IMPRESSÃO REGIA. ANNO 1833.

Por Ordem Superior.

SENHOR:

OS Membros da Commissão de Medicina abaixo assignados, encarregados do Relatorio da Epidemia d'Aveiro, beijando com todo o acatamento a Augusta Mão de Vossa Magestade, apresentam os seus trabalhos.

Mauricio José dos Santos,
Medico do Exercito, Inspector.

José da Rocha Miranda de Figueiredo,
Medico do Partido de Aveiro.

Doutor Carlos José Pinheiro.

Lourenço José de Moraes Callado.

SENHOR:

O 2.º Membro da Comissão de Me-
dição abaixo assignados, encarregados
do Relatório da Epidemia d'Aveiro, dei-
xando com o 1.º Membro da Comissão
a Mão esquerda, para a Mão direita,
e os seus trabalhos.

Maurício José dos Santos
Médico do Exercito, Inspector.

José da Rocha Miranda de Figueiredo,
Médico do Partido de Aveiro.

Doutor Carlos José Pinheiro.

Luiz de Moraes Callado.

HISTORIA.

EM hum Bairro da Cidade d'Aveiro, denominado — Bairro dos Pescadores — situado nas margens da Ria, se desenvolveo a 6 de Fevereiro do presente anno de 1833 huma Epidemia, cujos Symptomas guardavão grande afinidade com aquella, que da Asia tem grassado por varios Paizes da Europa debaixo do nome de — Cholera-Morbus. — Esta Epidemia apparecêo tambem ao mesmo tempo nas Villas d'Ilhavo, e Mira, e poucos dias depois nas Povoações d'Arada, Gafanha, Fermelã, Vagos, Frossos, e Eixo. Foi lenta, e astuciosa na sua marcha até ao dia 16, em que se patenteou energicamente, atacando neste pequeno Bairro dos Pescadores a 79 pessoas, das quaes fallecêrão 10. Este movimento despertou o Juiz de Fôra d'Aveiro, o qual ouvindo o Medico do Partido, recorreo ás Authoridades visinhas para o auxiliarem, e tomarem prévias medidas, em quanto não chegavão as providencias d'ELREI NOSSO SENHOR. No dia 20 reunidos quasi todos os Medicos da Comarca d'Aveiro, discorrêo-se sobre a Therapeutica. No dia 21 o Medico do Partido com o Cirurgião fez a primeira Authopsia Cadaverica, para examinar o estado das visceras. No dia 23 chegou a esta Cidade o Lente de Medicina, e Anatomia, mandado pela Universidade; e no mesmo dia tambem o Inspector dos Hospitaes Militares do Sul do Douro,

pela parte, que lhe tocava na responsabilidade d'elles. Estes dous Facultativos, de acôrdo com o Medico do Partido d'Aveiro, e com o Medico do Partido d'Ilhavo, tractarão de reconhecer a Epidemia, estudando, e avaliando seus Symptomas nos vivos, e consultando nos mortos as visceras, por não haver outra bussola mais fiel no meio do procelloso pélagos de tantas opiniões ácerca da Cholera-Morbus na Asia, e na Europa, nascidas talvez, humas por força de muito generalisar, outras por serem escriptas por Auctores, que a não presenciãrão; outras finalmente por Auctores dominados pelo espirito de partido de doutrinas medicas.

Esta Epidemia só obrou com energia desde o dia 16 de Fevereiro até ao fim do mesmo, começando a decrescer no mez de Março, porque então já estavam em actividade os meios para serem soccorridos os desgraçados, cuja indigencia reforçava vigorosamente semelhante flagello. No principio de Março começou esta Epidemia de tal sorte a decrescer, que nos ultimos dias já não havia pessoa alguma novamente affectada. Se ella não estiver insidiosamente sopita ganhando tempo para adquirir maior grão de força, como já acontecêo, e depois fazer os mesmos estragos, que em outros Paizes, podemos avançar que he bem semelhante a hum vegetal indigeno, o qual, sendo transplantado para terra estranha, apenas conserva a forma externa, porque das suas virtudes humas alterarão se, outras mudarão-se, outras finalmente perdêrão-se, adquirindo novas. Semelhante flagello em huma Região remotissima do seu natal debaixo d'outro Clima, no meio de circumstancias locaes, e entre individuos de habitos, e costumes diferentes, perdêo muito da sua indole maligna, mas ainda conserva as feições do tronco primitivo; face quasi hypocratica, frio glacial, côr pallida, espiração

fria, pulso apenas sensível, sêde ardente, dores fortes abdominaes, dijecções alvinas, caimbras das extremidades, contracção fixa dos flexores dos dedos; tegumentos dos mesmos rugosos, voz sentimental, vista de quem está affectado de grande commiserção, conjunctiva injectada, gemidos maviçosos, situação no leito sempre a mesma: taes são os principaes pontos de contacto d'esta Epidemia com a da Asia, Russia, e Polonia. Se attendermos a época da sua invasão, ella he indeterminada, porque huns fôrão affectados de manhã, outros de tarde, outros finalmente de noite, e nem ha preludios de invasão: alguns Pescadores poucas horas antes tinham partido bons para o mar. Grandes fôrão as luzes ministradas pela Anatomia Pathologica para filiação dos Symptomas com o estado das visceras, porque d'outra sorte toda a Therapeutica seria arbitraria, e o número das victimas seria sem conto. Foi hum dever tapar os ouvidos ao que avançã certas Authoridades de grande peso: — « Puisque les lumieres de l'Anatomie Pathologique nous laissent sans guide dans la recherche du siege et de la nature du Cholera épidémique, voyons si la Symptomatologie pourra nous être en meilleure aide. » — Proposição muito forte, que não fêre menos a Clynica, do que o raio a hum edificio; só deveria ser avançada, quando se tivessem dissecado colericos por todas aquellas partes do Globo, por onde semelhante flagello tem grassado; e se em todas ellas a Anatomia Pathologica nos negasse a sua guia, então justa seria a Proposição.

DESCRIÇÃO.

Esta molestia he caracterisada por dous períodos, a hora da sua invasão he indeterminada, a successão dos seus Symptomas he a seguinte: = Predisposições, e causas occasionaes. = A observação mostrou a indifferença dos sexos, temperamentos, e das idades; he verdade que a respeito dos sexos em Aveiro fôrão affectadas mais mulheres, do que homens, porém não foi assim em as outras Povoações: a classe indigente foi, a que mais padecêo. Os depositos de estrumes, as aguas estagnadas pelas ruas, como em a Villa d'Ilhavo, a falta de limpeza nos edificios, e seus habitantes, os máos alimentos, e alguns de substancias animaes já corruptas, finalmente a falta de reparo aos rigores do tempo não podião deixar de atear o fogo epidemico.

I. PERÍODO.

Symptomas.

Dôres na região umbilical, que em alguns se estendião até ás regiões hypogastrica, e publica; diarrhêa sero-albuminosa, e ás vezes biliosa; vômitos da mesma natureza, a que se seguia hum frio glacial por toda a periferia, e ás vezes este coincidia com aquelles; olhos retrahidos para o interior das fossas orbitas, conjunctiva injectada, palpebras lividas, face macilenta, e pállida, e toda a periferia externa; musculos das extremidades em contracção fixa, vista maviosa, espiração fria, lingua mucosa ligeiramente humida, e fria; sêde ardente, pulso em geral contrahido, e duro, e muitas vezes imperceptivel, caimbras das extre-

midades, unhas lividas, e tegumentos dos dedos rugosos. Tal he o concurso, e successão dos Symptomas, que constituem o primeiro periodo, e o mais perigoso deste flagello.

II. PERIODO.

Este periodo era em geral hum começo da resolução do morbo, porque a temperatura periferica se elevava, a pelle mostrava-se macia, e humida, o pulso se desenvolvia, e cessava o estado spasmodico dos musculos voluntarios. Mas ainda continuavão sêde ardente, dôres abdominaes, diarrhêa, e vômitos; porém estes, e aquella algumas vezes desapparecêrão antes deste periodo, que bem se pôde chamar o da reacção, a qual no maior auge degenerava em febre; sêde, e huma sensação dolorosa ao tacto no abdomen continuavão por todo o tempo da convalescença.

THERAPEUTICA.

O estado inflammatorio dos intestinos delgados confirmado pelas luzes da Anatomia Pathologica, estendendo-se ora até o estomago, ora até os intestinos grossos, e mesmo até o mesenterio; estado este, que sendo bem examinado tinha sua sêde na membrana mucosa, e que em varios Cadaveres apresentava porções gangrenadas, e outras invaginadas; este estado, digo, comparado com aquella dôr da região abdominal, que era hum dos primeiros Symptomas, que se manifestava, e ultimo, que cessava, nos levárão a sustentar, que a Epidemia d'Aveiro affectava principalmente os intestinos delgados, que os spasmos, e mais phenomenos nervosos erão consensuaes; porque depois delles

cessarem ainda continuava a molestia; e nos casos leves, isto he, naquelles, em que a Epidemia obrou fracamente, elles não tiveram lugar.

Ainda que os vermes fazião alguma perplexidade, porque todos estes phenomenos podião existir na presença delles; com tudo a quantidade, que se expellia durante a molestia, e que depois da morte se encontrava nos intestinos, era tão pequena, que não correspondia ao gráo da inflamação senão em dous Cadaveres; além disto hum de nós lembrado está, que a Epidemia de 1810, pela invasão das Tropas Francezas, tambem teve a complicação verminosa. Pelo que attendendo a estas circumstancias internas, e ao estado da periferia externa, claro estava que se devia debellar a phlogose intestinal pelo uso interno dos anti-phlogisticos, e despertar externamente a acção dos capillares cutaneos, que era quasi nulla pelo estado de torpor, e quiescencia do coração, e das arterias, sendo a circulação tão nulla nas extremidades, que muitas vezes se receou a gangrena das inferiores. Forão por tanto applicados internamente os cosimentos de grama, cevada, althêa, as emulsões, cosimentos de ponta de veado; e externamente nas extremidades os rubefacientes, as flannels; e sobre a dôr sanguesugas, linimentos, e cataplasmas emollientes. A sangria geral sempre aproveitou, sendo applicada na invasão da molestia, e quando o pulso não tinha inteiramente desaparecido; o sangue he verdade era evacuado com alguma difficuldade, mas o calôr periferico começava logo a desenvolver-se. Hum de nós vendo os bons effeitos da sangria suppôz, que elles erão devidos por ella obrar revulsivamente, mas os outros Facultativos continuarão com ellas evacuativas por verem, que todos os Symptomas diminuião, e a convalescença era prompta. Em pe-

riodo adiantado o sangue não corria absolutamente por mais diligencias, que se fizessem.

Para dar mais força ao que fica dito, seguem-se alguns diários dos casos mais graves, e dos menos, com as Authopsias de todos quantos fallecerão nesta Cidade, e alguns d'outras Povoações mais proximas.

OBSERVAÇÃO I.

José André, de 40 annos de idade, assistente no Bairro dos Pescadores: no dia 14 de Fevereiro andando á pesca começou a sentir dôres pelo abdomen, frio nas extremidades, sede intensa, vomitos, e caimbras. No dia 15 ás 8 horas da manhã sendo chamado Facultativo notou o seguinte = frio quasi glacial por toda a periferia externa, face macilenta, olhos encovados, palpebras lividas, caimbras nas extremidades inferiores, pulso quasi nullo, vista amortecida, espiração fria, lingua humida, branca, e fria; sede ardente, vomitos repetidos de liquido sero-albuminoso, voz fraca, dores abdominaes, principalmente na região umbilical, diarrhêa de liquido semelhante ao dos vomitos. Foi posto no uso interno d'hum cosimento de cevada, e grama, e d'huma cataplasma emolliente sobre o abdomen, dita de mostarda nas extremidades; sangria de 6 onças na saphena, que com difficuldade deitou sangue, sendo impossivel faze-lo correr das brachiaes.

Dito dia ás 5 horas da tarde.

Menor dôr no abdomen: foi repetida a sangria, e o sangue já corrêo mais facilmente.

16 ás 9 horas da manhã.

Expulsão de vermes lombricoides superior, e inferiormente; pulso desenvolvido, e os outros Symptomas diminuidos. Continuou o mesmo tratamento.

4 horas da tarde

Cessarão as caimbras, e vomitos: a diarrhêa, e dores erão menores.

17 ás 9 horas da manhã.

Calôr periferico quasi natural; appetite aos alimentos; terminou a diarrhêa, continuava a dôr do abdomen levemente.

Dia 18.

Ficou convalescente.

OBSERVAÇÃO II.

José, de 23 annos de idade, Pescador robusto: a 17 de Fevereiro foi atacado com dôres abdominaes, diarrhêa, vomito de liquido sero-albuminoso, frio geral, e nas extremidades quasi glacial, espiração, e lingua fria, sêde ardente: sendo observado apresentava, além dos Symptomas referidos, olhos encovados, palpebras lividas, face macilenta, e pállida, pulso nullo.

Dia 18.

Continuárão os mesmos Symptomas, resistindo a todos os soccorros medicos, tanto internos, como externos até o dia 20, em que expirou.

AUTHOPSIA CADAVERICA.

Visceras da cavidade craneana no estado normal. Cavidade thoracica = o coração continha sangue nas suas cavidades; a auricula, e ventriculo direito estavam consideravelmente dilatados. Cavidade abdominal = o estomago continha 8 onças de liquido sero-albuminoso, ligeiramente tinto de bilis; a mucosa junto á grande curvatura, e hum pouco para a face anterior estava inflammada em varias partes, e tambem o duodeno, jejuno, e ileon: continhão liquido analogo ao do estomago. Na bexiga do fel haveria 4, ou 5 onças de bilis verde-negra.

OBSERVAÇÃO III.

Maria Ratôa, casada, de 60 annos de idade, moradora na Villa d'Arada, tendo vindo descalça da feira da Oliveirinha no dia 21 de Fevereiro pelo rigor da chuva, foi acommettida nessa mesma noite de dores pelo ventre, diarrhêa, vômito, frio geral, sêde, e caimbras nas extremidades. Não recorreo a Facultativos, falleceo antes de 24 horas.

AUTHOPSIA CADAVERICA.

Visceras das cavidades craneana, e thoracica no estado normal. Abdomen meteorizado. Sua cavidade = epiplon inflammado, assim como os intestinos delgados em todo o seu trajecto, os quaes continhão vermes lombricoides, e liquido sero-albuminoso, o qual existia tambem no estomago. Fígado obstruido por lesão antiga; sua vesicula continha pouca bilis.

OBSERVAÇÃO. IV.

Anna, mulher recolhida, de 26 annos de idade, moradora na Cidade: na noite de 19 de Fevereiro começou a sentir dôres precordiaes, e oppressão, vômitos de liquido albuminoso de côr cinzenta, diarrhêa da mesma natureza do vômito com vermes lombricoides; frio geral, sêde ardente, lingua, e espiração extraordinariamente frias, olhos encovados, face macilenta, e pállida. Estes Symptomas ficarão estacionarios, não obstante os soccorros medicos, até o dia 24, em que rapidamente tomarão maior auge, e expirou na tarde do dia 25.

AUTHOPSIA CADAVERICA.

Visceras das cavidades craneana, e thoracica no estado normal. Cavidade abdominal = pontos inflammatorios no epiploon; a mucosa do estomago, e dos intestinos delgados inflammada até o colon ascendente, algumas porções do jejuno, e duodeno atacadas de gangrena. Não apparecêrão vermes, mas continhão hum liquido verde-negro. O figado inflammado, e adherente ao diafragma por toda a face convexa do lobulo esquerdo. A vesicula do fel continha 3 onças de bilis verde-negra.

OBSERVAÇÃO V.

Susana, de 60 e tantos annos de idade, mendicante, moradora na Villa de Ilhavo, viuva de Domingos, que já tinha fallecido da mesma molestia na vespera do dia 20, em cuja tarde começou ella a ter dores pelo ventre, diarrhêa esbranquiçada com vermes, vômitos, sêde ardente, e frio geral; e assim esteve até o dia 23, em que morrêo.

sem procurar soccorro algum. Esta historia foi dada por huma vizinha da mesma.

AUTHOPSIA CADAVERICA.

Visceras das cavidades craneana, e thoracica no estado normal. Cavidade abdominal = o epiploon ligeiramente inflammado. A mucosa do estomago toda alterada, e na parte correspondente a grande curvatura com varios pontos negros da grandeza das cabeças d'alfinetes ordinarios; continha huma libra e meia de liquido albuminoso de côr verde. Inflammção intensa no duodeno, e cada vez maior no jejuno, e ileon, que em dous lugares continhão dous novellos de lombricoides correspondendo-lhes gangrena. O cego muito alterado por adherencias, e excrescencias fungosas. No colon terminavão estas lesões. A vesicula do fel estava cheia de bilis espessa, e verde, que pouco mais ou menos seria meia libra.

OBSERVAÇÃO VI.

Maria, de mais de 60 annos, casada, e moradora no Bairro dos Pescadores. Na manhã do dia 23 de Fevereiro foi acommettida da Epidemia, e sendo observada ás 2 horas da tarde por Facultativo, apresentava o seguinte = dôres por todo o abdomen, diarrhêa, e vômitos de materias albuminosas, lingua fria, e humida, sêde ardente, olhos encovados, palpebras lividas, frio glacial por todo o corpo, principalmente nas extremidades, pulso nullo; musculos abdominaes, e flexores das pernas em contracção fixa; falleceo junto á noite.

AUTHOPSIA CADAVERICA.

Visceras das cavidades craneana, e thoracica no estado normal. Cavidade abdominal = o estomago continha 3 a 4 onças de liquido albuminoso; a membrana mucosa do duodeno desde a porção correspondente á vesicula do fel estava inflamada, e cada vez mais até o jejuno, e ileon. A vesicula do fel tinha 3 a 4 onças de bilis escura.

OBSERVAÇÃO VII.

João, de dous annos e meio de idade, do Bairro dos Pescadores, foi atacado na manhã do dia 23 de vômitos e diarrhêa. A' huma hora da tarde foi observado pelos Facultativos, que notárão o seguinte = olhos retrahidos para as fossas orbitas, palpebras lividas, convulsões nos musculos da face, principalmente no orbicular dos labios, e nos das extremidades superiores, e inferiores de sorte, que estava sempre a descobrir-se; a periferia, além de excessivamente fria, estava pallida, e livida, pulso nullo, gemidos repetidos a cada convulsão. Na presença dos Facultativos foi envolvido em baetas quentes, dando signaes d'allivio; pelo que foi mettido n'hum banho sinapisado, com o qual o calor periferico se restabelecêo. Sendo observado ás 5 horas da tarde, notou-se o mesmo frio, e falleceo n'alta noite.

AUTHOPSIA CADAVERICA.

Visceras das cavidades craneana, e thoracica no estado normal. Cavidade abdominal = o estomago continha meia libra de liquido albuminoso de côr cinzenta, e muito fetido; a mucosa dos in-

testinos delgados até o colon transverso fortemente inflammada, propagando-se a inflammção até o mesenterio; os intestinos continhão huma materia verde puriforme mais espessa, do que a do estomago, com alguns lombricoides; o ileon estava contrahido na metade do seu diametro. A bexiga do fel teria duas onças de bilis verde.

OBSERVAÇÃO VIII.

Anna, de 25 annos de idade, casada, e moradora na Villa de Vagos, mendicante: no dia 25 de Fevereiro pelas 3 horas da tarde sentio frio violento, diarrhêa de liquido sero-albuminoso com vermes, a qual cessou á noite, e então apparecêo sêde ardente, vomitos frequentes de materia negra, dores abdominaes, frio por toda a pelle, e caimbras. Estes Symptomas augmentarão até á madrugada do dia 27, em que fallecêo sem auxilios medicos.

AUTOPSIA CADAVERICA.

do Visceras das cavidades craneana, e thoracica no estado normal. Cavidade abdominal = o epiploon inflammado na porção inferior do lado direito, os intestinos delgados tambem inflammados, principalmente o duodeno, e ileon, que tinhão huma côr violacea; a bexiga do fel continha duas onças de bilis verde.

OBSERVAÇÃO IX.

João Nunes, de 70 annos de idade, casado, da Villa de Vagos: na noite de 25 de Fevereiro esfriou em toda a periferia, e foi atacado de diarrhêa, que continuou até á madrugada do dia 26, em que começárão caimbras nas extremidades, vomitos,

e vigilia. A's 9 horas da manhã, dôres na região abdominal, e seguiu-se logo a morte. Este doente bebêou pouco depois da invasão da molestia çumo de limão com ortelã, e quatro horas antes da morte comêo, porque desejou, gallinha, e sôpas della, o que tudo foi vomitado na occasião das dôres abdominaes. Não teve auxilios medicos.

AUTHOPSIA CADAVERICA.

Visceras das cavidades craneana, e thoracica no estado normal. Cavidade abdominal = o epiploon adheria as paredes do abdomen por varios pontos; os intestinos delgados, e colon transverso inflammados, e algumas porções já com rubor violaceo. A bexiga do fel continha 3 onças de bilis verde.

OBSERVAÇÃO X.

Marianna, de 50 annos de idade, solteira, moradora no Bairro dos Pescadores, padecia hum diarrhêa chronica. Na tarde do dia 26 de Fevereiro foi atacada de hum accesso de frio. Sendo observada ás 5 horas d'essa mesma tarde apresentava calôr periferico muito diminuido, contracção fixa nos flexores das extremidades, e dos dedos; tegumentos destes rugosos, palpebras lividas, olhos encovados, lingua humida, e fria, pulso quasi nullo, sensibilidade na região hypogastrica quando era comprimida, dejeccões alvinas serosas com vermes. Forão applicados banhos quentes aos pés, cataplasma emoliente no abdomen, e internamente cosimento de cevada, e grama com xarope d'avenca. A's 7 horas da tarde apparecêrão vomitos lymphaticos, e grande contracção no ventre. Ao romper do dia expirou.

AUTHOPSIA CADAVERICA.

Visceras das cavidades craneana, e thoracica no estado normal. Cavidade abdominal = todos os intestinos delgados em grangrena, a qual terminava em côr rubra para os grossos, e para o estomago; huma invaginação de meio palmo no jejuno, que continha alguns vermes.

OBSERVAÇÃO XI.

Luiz, de 40 annos de idade, robusto, morador no Bairro dos Pescadores: na manhã do dia 26 de Fevereiro partio bom para a Pescaria, e ás 9 horas da mesma foi atacado de frio, dejecções alvinas albuminosas, e vomitos de tal sorte, que chegando ao porto foi conduzido em braços para casa. A's 3 horas da tarde forão chamados Facultativos, os quaes notárão o seguinte = face macilenta, e pállida, e n'alguns pontos rubor violaceo, olhos encovados, palpebras lividas, lingua fria, humida, e branca, espiração fria, dyspnea, e vóz rouca, pulso duro, e muito contrahido, dôr na região hypogastrica, e na umbilical, sendo nesta menor. Forão applicados os rubefacientes (sem effeito); por tres vezes se tentou a sangria nas brachiaes, que não deitárão sangue; applicárão-se sanguesugas na região hypogastrica, e depois na região anal, as quaes não pegárão. Junto á noite tentou-se a sangria na saphena, e acontecêo o mesmo, que nas brachiaes. Fallecêo nessa mesma noite.

AUTHOPSIA CADAVERICA.

Visceras da cavidade craneana no estado normal. Cavidade thoracica = pulmões injectados de

sangue negro; cavidades direitas do coração extraordinariamente dilatadas, e cheias de sangue. O epiploon inflammado; o estomago estava tão contrahido, que apresentava o mesmo diametro, que os intestinos delgados, e continha 3 onças de bilis; sua mucosa, e a do duodeno inflammadas; o jejuno em perfeita gangrena. A vesicula do fel continha 5 onças de bilis verde-negra.

OBSERVAÇÃO XII.

Josefa, de 30 annos de idade, temperamento lymfatico, solteira, moradora no Bairro dos Pescadores: na noite de 26 de Fevereiro foi incommodada de nauseas, e depois seguio-se diarrhêa com vermes. Sendo observada ás 10 horas da manhã do dia 27, apresentava frio geral por toda a pelle, olhos encovados, palpebras lividas, lingua branca, fria, e humida, halito frio, sensibilidade por todo o abdomen, e dôr na região hypogastrica: diarrhêa sero-albuminosa, caimbras nas extremidades inferiores, pulso pequeno, e molle. Foi posta no uso interno de hum cosimento de grama, e cevada; externamente sanguesugas no abdomen, banhos mostardados aos pés.

4 horas da tarde:

Apparecêrão vomitos da mesma natureza, que os da diarrhêa; pulso quasi nullo, receitou-se cataplasma emolliente sobre o abdomen, e fricções estimulantes para as extremidades.

Dia 28, 9 horas da manhã.

Face hypocratica, frio glacial, vomitos, e diarrhêa suspendidas; cessarão as dôres do abdomen. Vesicatorios nas côxas.

4 horas da tarde.

Moribunda: falleção ás 8 horas.

AUTHOPSIA CADAVERICA.

Visceras das caydades craneana, e thoracica no estado normal. Cavidade abdominal = o estomago contrahido, não tendo mais que huma pollegada de diametro: duodeno, e ileon inflammados; e o jejuno em completa gangrena: continhão vermes. A vesicula do fel continha 4 onças de bilis flava.

OBSERVAÇÃO XIII.

Bernardo Estromento, de 70 annos de idade, Pescador, casado: na manhã de 26 de Fevereiro estando na Pescaria foi acommettido de frio geral, vomitos, diarrhêa serosa com vermes. A's 4 horas da tarde, sendo observado, notou-se o seguinte = periferia externa fria, spasmos dos musculos da face, olhos muito retrahidos para as fossas orbitas, palpebras lividas, vista moribunda, lingua mucosa, e muito humida, sêde ardente, pulso quasi nullo, dôres no abdomen, caimbras fortes das extremidades. Foi posto no uso de cosimento de cevada, e huma cataplasma emolliente sobre o abdomen, e banhos mostardados aos pés.

27 de Fevereiro.

Calor natural na periferia; a diarrhêa, e vomitos cessarão, dôres no abdomen menores, a sêde ardente continuava.

Dia 28.

Voltarão os vômitos, diarrhêa, e dôres abdominaes, entre tanto estavam minorados todos os outros Symptomas.

1.º de Março.

Cessarão os vômitos; a diarrhêa minorada, porem as extremidades estavam frias.

Applicarão-se fricções d'espírito de vinho camphorado nas extremidades.

Dia 2.

Continuárão os mesmos Symptomas, queixava-se de retenção d'ourinas, e dôres na região pública. Mandou-se fazer fricções de linimento emolliente sobre a região publica.

Dia 3.

Outra vez vômitos com sede ardentissima, face hypocrática, todos os mais Symptomas peiores.

Dia 4.

Continhou tudo da mesma maneira.

Dia 5.

Cada vez peor: vesicatorios volantes.

Dia 6.

Fallecêo á huma hora da tarde.

OBSERVAÇÃO XIV.

Anna, do Bairro dos Pescadores, de 12 annos de idade: na manhã de 26 de Fevereiro começou a sentir grandes dôres pelo ventre, pouco depois frio geral, vômitos, diarrhêa com grande quantidade de vermes. Sendo observada nessa tarde pelos Facultativos, notou-se o seguinte: frio geral por toda a periferia, sendo glacial nas extremidades; caimbras fortissimas, olhos encovados, palpebras lividas, musculos abdominaes em spasmo tonico, pulso imperceptivel, sêde ardente, lingua fria, e humida, halito frio, vômitos, e diarrhêa de materia sero-albumiposa, dôres vehementissimas no abdomen. Fez-se logo huma sangria de 5 onças no braço: o sangue corrêo com muita difficuldade; applicou-se huma cataplasma emolliente sobre a dôr, e os rubefacientes nas extremidades: ficou no uso interno de hum cosimento de cevada, e grama.

Dia 27 de Março ás nove horas da manhã.

Pulso mais desenvolvido, calor periferico mais augmentado. Repetio-se a sangria na quantidade de 8 onças, corrêo o sangue facilmente.

Cinco horas da tarde.

Calor periferico restabelecido, pulso desenvolvido, diarrhêa suspendida. A face foi tomando o seu estado normal; a conjunctiva ainda se achava bastantemente injectada, os outros Symptomias ião em diminuição.

Dia 23. — Nove horas da manhã.

Cessarão os vômitos; voltou a diarrhêa mais moderada.

Cinco horas da tarde.

Nada de novo.

Dia 1.º de Março

Continuárão as melhoras até ao dia 2, em que ficou convalescente.

OBSERVAÇÃO XV.

João Gamellas, de 40 annos de idade, Pescador; estando com perfeita saúde, foi assaltado no dia 27 de Fevereiro de dôres no abdomen, e depois diarrhêa, e vômitos de materia sero-albuminosa, e frio geral: observado ás nove horas da manhã do dia 28, apresentava o seguinte: toda a periferia externa fria, com especialidade as extremidades, que erão atacadas de caimbras; olhos encovados, palpebras lividas, vista moribunda, conjunctiva injectada, lingua mucosa, e fria, arrotos, sêde ardente, halito frio, diarrhêa, e vômitos de materia sero-albuminosa com vermes, dôres por todo o abdomen, pulso imperceptivel. Foi posto no uso d'hum cosimento de grama; applicárão-se sanguesugas no abdomen, e depois huma cataplasma emolliente, e nas extremidades os rubefacientes.

1.º de Março. — Nove horas da manhã.

Continuárão os mesmos Symptomas.

Tres horas da tarde.

Melhor aspecto. Accusou difficuldade na excreção da urina: mandou-se fazer fricções emollientes na região pubical, e no perineo.

Dia 2. — Dez horas da manhã.

As dôres no abdomen erão menores, e a frequência dos vômitos.

Tres horas da tarde.

Cessarão os vômitos, e a difficuldade d'ouirnar: pulso mais desenvolvido.

Dia 3 ás nove horas da manhã.

Cessou a diarrhêa, e tudo o mais a melhor.

Cinco horas da tarde.

Continuárão as melhoras.

Dia 4 ás onze horas da manhã.

Circulação, e calôr periferico restabelecido.

Dia 5.

Foi dado em convalescença, e assim continuou até ás onze horas da noite do dia 10, em que foi novamente atacado de frio, contracção de pulso, e de mais delirio desasocogado, aversão a todos os liquidos, menos a agua fria. Foi posto no uso d'hum cosimento de cevada, e grama; applicárão-se vesicatorios ás extremidades inferiores.

Dia 11 ás nove horas da manhã.

Delirio augmentado, face hypocratica, tudo a peor. Applicarão se fricções estimulantes na espinha dorsal.

Tres horas da tarde.

Os vesicatorios não produzirão effeito : continuou o augmento da gravidade dos Symptomas até ás dez horas da noite, em que fallecêo.

AUTHOPSIA CADAVERICA.

Visceras da cavidade thoracica no estado normal. Cavidade craneana. — todos os osseios da duramater estavam bastantemente cheios de sangue negro, e espesso, a arteria espinosa, e suas ramificações muito injectadas, assim como os vasos da pia-mater, e todos os ramos da carotida interna, e da basilar. O cérebro estava mais consistente, que o ordinario, suas cavidades nada tinham de notavel. Cavidade abdominal. = O epiploon de côr rubra, e tambem o duodeno, e jejuno; o ileon só tinha alguns leves vestigios junto ao jejuno, e proximamente ao cêgo. Este doente parece ter succumbido por huma affeição secundaria, cuja séde estava no systema vascular cerebral, porque os symptomas, que se desenvolvêrão neste segundo ataque, tinham mais relação com a Authopsia das visceras cerebraes, do que com as abdominaes. Não foi possivel entrar no conhecimento das causas remotas, que de proposito se occultarão; mas nós nos persuadimos d'algum excesso de vinho, que suscitou huma inflammção nas meninges.

OBSERVAÇÃO XVI.

Maria Luiza Regalla, casada, de 50 annos de idade: na noite de 22 de Março, tendo ceado humas solhas, foi atacada ás 2 horas da madrugada de ancias, e dores pelo ventre, pouco depois diarrhêa sero-albuminosa; ás 6 horas da manhã apparecêrão vômitos de liquido semelhante ao da diarrhêa, ligeiramente córada de bilis flava; suores frios por todo o corpo, olhos encovados, palpebras lividas, conjunctiva hum tanto injectada, vista moribunda, sêde ardente, e caimbras. Sendo examinada ás 9 horas da manhã, além dos Symptomas referidos, tinha hálito frio, e pulso contrahido. Foi sangrada no braço direito, corrêrão algumas gotas de sangue negro; deitarão-se sanguesugas na região anal, cataplasma de mostarda nos pés, dicta emolliente no abdomen, fricções estimulantes nos braços, e pernas. Foi posta no uso interno de hum cosimento de cevada com xarope d'althêa. A's 4 horas da tarde todos os Symptomas exacerbadados; ás 5 horas expirou.

AUTHOPSIA CADAVERICA.

Visceras das cavidades craneana, e thoracica no estado normal. Cavidade abdominal = o ileon, cego, e colon transverso, e descendente gangrenados. Apparecêrão alguns vermes; a vesicula do fel continha 4 onças de bilis verde-negra.

OBSERVAÇÃO XVII.

João da Silva, de 40 e tantos annos de idade, da Villa d'Arada, trabalhador. No dia 3 de Março foi atacado de vômitos, e diarrhêa; no dia 4

levantou-se bom, e foi para o trabalho; no dia 5 depois do meio dia foi atacado de frio por toda a periferia, vômitos, diarrhêa serosa lançando 25 vermes, dores fortes pelo ventre, e fortissimas no hypochondrio direito. Sendo examinado notou-se o seguinte = olhos encovados, falta de vista, face macilenta e pálida, pulso imperceptivel, lingua humida, e mucosa, sede ardente, ligeiras dôres pelas pernas, vômitos, e diarrhêa. Foi posto no uso interno d'huma emulsão feita em cosimento de grama, e sanguesugas no abdomen, das quaes só 3 pegarão.

6 de Março ás 5 horas da tarde.

Conjunctiva injectada, pulso frequente, e molle, calor periferico natural, lingua rubra, sede ardente, dores fortes pelo ventre: cessarão os vômitos e diarrhêa: accusou dysuria; porém de manhã havia urinado.

7 ás 9 horas da manhã.

Face hypocratica, calor periferico augmentado, lingua fria, sede ardente, pulso pequeno, e tardo, dyspnea, tósse, oppressão na região hypogastrica, dôr obtusa no hypochondrio direito, musculos abdominaes em contracção fixa, apparecêo de novo a diarrhêa, continuou a dysuria. Repetirão-se as sanguesugas, determinarão-se crysteis emollientes, continuando o mais.

Falleceo pelas 3 horas da tarde.

AUTHOPSIA CADAVERICA.

Visceras das cavidades craneana, e thoracica no estado normal. Cavidade abdominal = o men-

to, duodeno, jejuno, e cego inflammados; ileon, e colon transverso gangrenados; huma porção do duodeno invaginado no jejuno. A bexiga do fel continha meia libra de bilis negra; a bexiga urinaria inteiramente contrahida, sem indício algum de inflamação, e sem urina.

OBSERVAÇÃO XVIII.

Joaquina de Jesus, de 21 annos de idade, assistente no Bairro dos Pescadores: na noite de 4 de Março foi atacada de dores pelo abdomen, anxiedades, frio geral por toda a periferia, e maior nas extremidades, caimbras, diarrhêa de materias sero-albuminosas com vermes. No dia 5 continuava o frio, e diarrhêa, apparecêrão vômitos com vermes, o liquido do vômito era semelhante ao da diarrhêa. Sendo observada por Facultativos no dia 6 de manhã notou-se o seguinte = toda a periferia externa fria, principalmente nas extremidades, olhos encovados, palpebras lividas, face macilenta, e pálida, as extremidades tanto superiores, como inferiores em contracção fixa; vômitos, e diarrhêa, dores abdominaes, sede intensa, lingua fria, e humida, pulso muito contrahido. Pôzerão-se-lhe sanguesugas na região abdominal, para serem succedidas por huma cataplasma emolliente; calefacientes nas extremidades; ficou no uso interno de hum cosimento de cevada com xarope d'avenca.

6 de Março ás 4 horas da tarde.

Dores, e diarrhêa diminuidas; o mais continúa.

Dia 7 de manhã.

Pulso menos contrahido, voltárão as dôres. Tudo o mais continuou.

Dia 7 de tarde.

Cessou a diarrhêa; dôres do abdomen augmentadas. Applicarão-se mais sanguesugas sobre o abdomen. Tudo o mais continuou.

Dia 8 de manhã.

Tornou a apparecer a diarrhêa com grande quantidade de vermes: continuava a dôr do abdomen.

Dia 8 de tarde.

Dôres augmentadas com anciedade; facie hypocratica. Falleceu ás 9 horas do dia seguinte.

AUTHOPSIA. CADAVERICA.

As extremidades superiores em contracção fixa. As visceras das cavidades craneana, e thoracica no estado normal. Cavidade abdominal = o jejuno, ileon, e cego até o colon ascendente inflammados, e com muitas constrictões, e dilatações; a maior parte do ileon já estava gangrenada, o jejuno tinha huma invaginação. Estes intestinos continhão huma quantidade extraordinaria de vermes, e gases extremamente fetidos. A bexiga do fel continha meia libra de bilis flava.

OBSERVAÇÃO XIX.

Maria Thomazôa, de 50 annos de idade, solteira, assistente na Villa d'Eixo: na noite do dia 4 de Março foi atacada de dores na região umbilical, diarrhêa de côr amarella, que depois tomou a côr branca com vermes filiformes de huma pollegada de grandeza. No dia 8 apparecêrão vômitos de liquido semelhante ao da diarrhêa; e sendo nesse mesmo dia observada notou-se o seguinte: — olhos encovados, palpebras lividas, lingua muçosa, e pouco humida, sêde ardente, halito frio, pulso quasi nullo, frio geral por toda a periferia, anciedade, e dôres fortes na região abdominal. Foi posta no uso interno de huma emulsão commum, cosimento de cevada, e grama, e agua panada; e externamente sobre o abdomen cataplasma emolliente, e nas extremidades flanelas quentes, e fricções sêccas. Assim continuou até o dia 12, em que apparecêo calor periferico, pulso frequente, dôres de ventre diminuidas, continuando a diarrhêa, e vomitos.

13 de Março.

Lingua humida, sêde ardente, calor periferico mais que o natural, pelle humida, pulso frequente. As dôres do ventre, diarrhêa, e vômitos mais moderados.

Dia 14.

Continuárão as melhoras até 20, em que ficou convalescente.

OBSERVAÇÃO XX.

Luiza Bernarda, de 35 annos de idade, casada, do Bairro dos Pescadores. No dia 3 de Março foi atacada de dôres pelo ventre com diarrhêa, sem mais algum incômodo, e assim andou até o dia 8, em que se augmentarão as dôres, apparecendo anciedade, e vomitos de materia lymphatica; sendo observada ás 11 horas notou-se o seguinte = frio geral, maior nas extremidades, flexores das extremidades em contracção fixa, pulso muito contrahido, olhos encovados, palpebras lividas, sêde ardente, lingua humida, e fria, o halito tambem frio, dôres fortes na região abdominal. Fez-se-lhe huma sangria de dez onças no braço, applicou-se-lhe huma cataplasma emolliente no abdomen, e calefacientes nas extremidades. Foi posta no uso interno de cosimento de cevada.

9 de Março.

Symptomas diminuidos, pulso mais desenvolvido, e duro. Repetio-se huma sangria de 6 onças, e continuou com o mais.

Dia 10.

Cessarão as dôres, calôr natural, pulso no estado normal. A diarrhêa tambem cessou; ainda teve dous vomitos, nos quaes vierão dous vermes. Ficou só no uso do cosimento.

Dia 10.

Continuou a melhor.

Dia 12.

Convalescente.

OBSERVAÇÃO XXI.

Manoel Alves Nuno, de 40 annos de idade: na noite de 4 de Março foi atacado de dôres no abdomen, diarrhêa, e vomitos lymphaticos; no dia 5 ás 8 horas da manhã caimbras nas pernas, frio por toda a periferia, pulso pequeno, e duro, olhos encovados, olheiras, halito frio, lingua mucosa, e humida, sêde ardente. Foi posto no uso de hum cosimento de cevada, fomentações emollientes no abdomen, sangria no braço de 10 onças, em que o sangue corréo com difficuldade.

5 de Março á tarde.

Não houve alteração nos Symptomas: a sangria foi repetida.

6 ás 9 horas da manhã.

Faltarão as caimbras, e vomitos, as dijecções alvinas erão biliosas, pulso normal.

Dia 7.

Continuárão as melhoras.

Dia 8.

Convalescente.

OBSERVAÇÃO XXII.

Anna Maria, de 30 annos de idade, casada: na noite de 5 de Março foi atacada de dôres fortes pelo ventre, vomitos, e depois frio, e caimbras. Sendo visitada no dia 6 ás 2 horas queixou-se de frio, e que a dôr passára para o lugar correspondente ás falsas costéllas direitas; continuavam os vomitos com pouca sêde, o calor periferico era natural, pulso frequente, contrahido, e algum tanto duro. Applicárão-se sanguesugas sobre a dôr, ao que succedêo huma cataplasma emolliente; e para uso interno huma emulsão commum.

7 de Março ás 11 horas da manhã.

Voltou a dôr para o ventre: apparecêrão vomitos biliosos, e muita tosse; lingua no estado normal.

Dia 8 de manhã.

Apparecêo menstruada com differença de 10 dias; suspendêrão-se os medicamentos; continuou a menstruação o periodo competente, no fim do qual se achou boa.

Este he hum exemplo dos levemente atacados, em que saltarão olhos encovados, palpebras lividas, face macilenta, a pállida, halito frio, e diarrhêa. A' imitação destes houve varios.

OBSERVAÇÃO XXIII.

Ventura Miguel Rascão, homem robusto, de 28 annos de idade, Pescador: na tarde do dia 6 de Março foi atacado de dôres pelo ventre, diarrhêa serosa, e vermes ascaridos, vomitos semelhantes

a materia da diarrhêa. Sendo observado no dia 7 ás 9 horas da manhã tinha o calôr periferico natural, excepto nas extremidades, que estavam bastante frias; caimbras, pulso pequeno, e duro, halito frio, lingua branca, humida, e fria, sêde ardente, e dôres na região umbilical. Foi posto internamente no uso de cosimento de cevada, e externamente fomentações emollientes sobre o abdomen, cataplasma de mostarda nas extremidades, e humã sangria de 8 onças no braço.

7 de Março, 4 horas da tarde.

Temperatura das extrêmidades mais elevada: repelio-se a sangria de 6 onças.

Dia 8, 9 horas da manhã.

Lançou dous vermes, calôr natural, pulso regular, cessou a diarrhêa, e vomitos, tinha pouca sêde.

Dia 9.

Huma dejeccão alvina, em que expulsou vermes, continuando as melhoras até o dia 10, em que ficou convalescente.

OBSERVAÇÃO XXIV.

Manoel de Anaia Faneca, de 75 annos, de idade, Pescador, no dia 10 de Março tendo almoçado sôpas de pão com azeite, laranjas, e caldo de castanhas, pouco depois teve vomitos biliosos, em que vinhão estas substancias. A's 3 horas da tarde foi observado, e notou-se frio periferico, ligeira dôr no abdomen, olhos encovados, olheiras, pulso quasi nullo, lingua branca, e fria, sêde ar-

lente, halito frio, vomitos, e diarrhêa de liquido sero-albuminoso. Foi posto no uso interno de hum cosimento de cevada, e externamente banhos mostardados aos pés.

Dia 11 ás 11 horas da manhã.

Os Symptomás se augmentarão, a côr da face era livida, olhos moribundos, a conjunctiva injectada, os labios lividos, vóz rouca, pulso quasi nullo, vomitos frequentes. Nessa manhã até ás 10 horas já erão 15 as dejecções alvinas. Foi posto no uso de hum cosimento branco internamente, e externamente cataplasmas de mostarda nas extremidades.

5 horas da tarde.

Spasmos violentos nas extremidades inferiores, seis dejecções alvinas com hum verme; cessarão os vomitos, calor sensivel nas extremidades superiores, pulso mais desenvolvido.

Dia 12.

Vomitos sêccos, dôres no abdomen, grandes gemidos a cada paroxismo; extremidades frias, unhas roxas, pulso quasi nullo. Applicarão-se sanguesugas na região hypogastrica, que forão seguidas de hum cataplasma emolliente. Fallecêo ás 5 horas.

AUTHOPSIA CADAVERICA.

Extremidades superiores em contracção fixa, visceras das cavidades craneana, e thoracica no estado normal: Cavidade abdominal = todos os intestinos em gangrena, com especialidade os delgados; e colon ascendente, continhão vermes, e gaz

muito fetido. A vesicula do fel conteria huma onça de bilis negra, e crassa.

OBSERVAÇÃO XXV.

Ignacia Roza, de 36 annos de idade, temperamento sanguineo, casada, moradora no Bairro dos Pescadores: no dia 10 de Março foi menstruada, o fluxo corrêo na forma ordinaria até á noite do dia 11. Sendo observada no dia 13 ás nove horas da manhã, accusou que, quando foi menstruada, logo começou a sentir alguns dos Symptomas seguintes — cephalalgia forte, olhos encovados, olheiras, pulso contrahido, e duro, extremidades frias, repetidos vômitos biliosos, lingua branca, e humida, sêde dyspnea, sensibilidade do abdomen á mais leve pressão. Foi posta no uso interno de hum cosimento de cevada, e externamente fricções emollientes no ventre; fez-se huma sangria no braço de oito onças.

Dia 13 ás tres horas da tarde.

Pulso mais desenvolvido, comtudo ainda duro, calôr mais augmentado, os vômitos deixavão maior intervallo livre, a respiração quasi natural. Repetio-se a sangria na quantidade de seis onças.

Dia 14 ás dez horas da manhã.

Cephalalgia diminuida, calôr natural, pulso regular. Cessarão os vômitos, e havião poucas dôres no abdomen.

Dia 15.

Convalescente.

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS AUTHOPSIAS.

Referimos neste Relatorio os diarios de todos aquelles, que fallecêrão, e suas Authopsias, mas dos que escapárão, escolhêrão-se só alguns diarios dos mais graves, porque seria longo referir todos. Não tendo nós Casas proprias para a abertura dos Cadáveres, vimo-nos na necessidade de as praticar nas Sacristias, e Casas das Fabricas dos Templos, por evitarmos a mágoa das familias dos mortos, que tão possuidas ainda estão de prejuizos, que nos foi preciso remover alguns obstaculos.

He necessario notar que todos os Cadáveres apresentavão huma contracção fixa dos flexores das extremidades superiores, e seus dedos, menos nos das extremidades inferiores, porque no acto de os amortelhar, empregavão violencia para as distender. As visceras das tres cavidades forão examinadas com vagar, e reflexão: he verdade que a spinal medulla não o foi na sua totalidade, mas só até á porção cervical, por ser preciso para isso espaço de horas; e por mais cautélas, que se empregasse no cortar as vertebbras, erão inevitaveis as contusões. Tambem o cerebro nunca apresentou hum estado tal, que attrahisse tão rigoroso exame. Tudo quanto se omitio ácerca das outras visceras, não foi por falta d'exame, massim por evitar encher paginas de commemorações negativas; e demais o fito destas disseccções era o procurar fiar os Symptomas com as visceras; a que se devião principalmente referir para a direcção das vistas therapeuticas. A Authopsia nos guiou em todos os Cadáveres no reconhecimento d'huma fluxão intestinal: tivemos sempre presente na memoria a constituição epidemica de parte do anno de 1669, e dos annos inteiros de 1670, 1671, e 1672, des-

cripta pelo Sabio Sydenham: firmamos em nossas mentes a doutrina do Professor Pinel, classando a Chólera Morbus no embaraço gastrico, e no embaraço intestinal, colhendo fructos do tractamento diluente, e involvente.

Temos reconhecido nesta Epidemia muitos dos caracteres descriptos por Sydenham « *Malum ipsum facile cognoscitur, adsunt enim vomitus enormes, ac pravorum humorum cum maxima difficultate, et angustia per alvum dejectio; ventris ac intestinorum dolor vehemens, inflatio, et distentio, cardialgia, sitis. Pulsus celer ac frequens, cum aestu, et anxietate, non raro etiam parvus, et inæqualis, insuper et nausea molestissima, sudor interdum diaphoreticus, crurum et brachiorum contractura, animi deliquium, partium extremarum frigiditas, cum aliis consimilis notæ symptomatibus, quæ astantes magnopere perterrefaciunt, atque etiam angusto viginti quatuor horarum spatio ægrum interimant.* »

Reflectindo sobre o estado, em que se achavão os intestinos delgados em todos os Cadáveres, nos recordamos muitas vezes, e muitas do que refere Foderé: « *Les miasmes, causes de l'épidémie, avales avec la salive et les alimens, se dirigent par les intestines, et produisent des dysenteries et des coliques épidémiques; ou bien la fièvre adynamique ou ataxique suscitée par ces miasmes fait une sorte de métastase sur le conduit alimentaire, en augmente l'action, le frappe de gangrène, ou donne lieu à la naissance d'une grande quantité de vers qui n'y existaient certainement pas auparavant. Dans la cohorte de maladies qui affligèrent l'Europe en 1557 on trouve grand nombre de coliques horribles et de flux intestinaux.* »

(Traité de Med. Leg. et de Hyg. Pub. T. 6.º)

PROPHYLAXIA.

Do conhecimento das causas remotas desta Epidemia he que se poderião estabelecer regras fundamentaes para os meios prophylacticos; mas semelhantes causas são latentes: não as podemos considerar como transmittidas pelas Relações commerciaes do mar das Indias, do Baltico, e do Escalda, não só por lhe saltar o character contagioso, pois era rarissima a Casa, em que fôrão dous affectados ao mesmo tempo, como principalmente por não seguir a razão directa das Relações estrangeiras, porque então serião mais atacados os habitantes, cujos Portos erão por elles frequentados.

Em Aveiro atacou os habitantes da margem da Ria, mas Ilhavo, que fica muito mais distante d'ella, cujas ruas estão cheias d'aguas estagnadas, menos humas, não foi menos atacada, que o Bairro dos Pescadores em Aveiro, immediato a Ria: Vagos, que está situado junto a Ria, só teve dous enfermos: Gafanha, que fica entre a Ria, e a Barra, teria quatro até cinco: Arada, que já fica na Estrada de Coimbra mais sobranceira a Aveiro, e Ilhavo, foi proporcionalmente tão affectada como estas. Por consequencia todos os meios prophylacticos não podião ser mais, do que aquelles, que já estavam insinuados pelas Ordens Superiores: taes erão remover tudo quanto podia augmentar o foco epidemico, como depositos de estrumes nas Ruas, e interior das Casas, promover a limpeza dos edificios, e renovação do ar nos mesmos com moderação, escolha de alimentos, desprezando os de difficil digestão, os demasiadamente estimulantes, e excitantes, examinando os cereaes, as carnes, e pescados séccos, o estado saudavel d'aquelles animaes, cujas carnes verdes fazem parte dos ali-

mentos; examinando as fontes, estabelecendo esgotos para as aguas estagnadas, purificando os ares com os desinfectadores. Fizerão-se fogueiras pelas ruas; mas hum de nós se lembrou, que no Relatorio da Peste de Marselha Cap. 8.º se lê, que ellas serão prejudiciaes; tambem o fôrão, segundo o Relatorio da Peste de Toulon, Cap. 22.º no anno de 1721. Mead refere muitos factos análogos a este respeito. Mas aqui reina-vão outras circumstancias. Houve grande vigilancia em prohibir o marisco, do qual fazia muito uso a classe affectada.

COROLLARIOS.

1.º A Epidemia d'Aveiro he affinis, com a que da Asia foi transplantada para varios Paizes da Europa; mas esta domada, talvez, debaixo d'outra latitude, entre circumstancias locais, e individuos de habitos, e costumes differentes.

2.º Não apresentava o character contagioso.

3.º A Anatomia Pathologica confirmou huma lesão constante nos intestinos delgados.

4.º A causa, ou causas desta lesão são latentes.

5.º Não he como outras o opprobrio da Medicina.

6.º Os affectados deixados a si mesmos são em geral victimas; assim como os recahidos pelo desvio da dieta.

7.º Os boatos aterradores, assim como alguns Escriptos dispersos não são fundados no verdadeiro conhecimento desta Epidemia.



bibliA

MAPPA

demonstrativo do N.º de doentes, e seu
resultado.

Povoações.	Atacados	Mortos	Curados
Aveiro, e Suburbios, e Villa d'Arada...	155	32	123
Carrromeu	2	1	1
Eixo	1	"	1
Fermelã.....	3	2	1
Frossos	1	"	1
Ilhavo, Gafanha, e outras Povoações annexas	115	31	84
Mira	7	4	3
Preza	2	1	1
Salreu	10	3	7
Seixo.....	5	1	4
Vagos.....	2	2	"
Somma.....	303	76	227

APPENDICE.

ESTANDO eu encarregado deste Relatorio, era do meu dever observar as enfermidades, que nos lugares limitrofes se desenvolvessem epidemica, ou endemicamente. Chegado eu d'Aveiro a Coimbra, ouvi, que em Maiorca grassava huma enfermidade; pelo que na tarde do dia 8 d'Abril parti a fazer hum reconhecimento da tal enfermidade. Com effeito encontrei a mesma Epidemia d'Aveiro, porém já muito enfraquecida. Chegando a Maiorca se me unio hum Facultativo, (que serve no impedimento do Medico do Partido por motivo de molestia) e dous Cirurgiões, os quaes disserão, que só existião tres doentes da molestia, que grassava, que erão duas mulheres, e huma creança, dos quaes este ultimo se achava já convalescente, e que restava ainda para se sepultar o cadaver de huma, que havia fallecido ás 4 horas da madrugada. Passei com elles a visitar as duas enfermas: a 1.^a estava no segundo periodo da Epidemia d'Aveiro, porque já tinham cessado os spasmos dos musculos voluntarios, e symptomas nervosos: o calor periferico era natural, o pulso frequente, e pouco duro, a lingua sêcca, e rubra, sêde ardente, tinham também cessado os vômitos, e dejeccões alvinas, mas ainda continuavão dôres precordiaes. Concorrámos no uso interno d'hum cosimento de cevada, e grama com xarope d'althea, e agua panada.

Tractei depois de firmar esta therapeutica pela autopsia, da que tinha fallecido ás 4 horas da madrugada, como se verá na Observação N.º 1.º Passámos depois a visitar outra enferma, a qual se achava no primeiro periodo da Epidemia, quando são levemente atacados: queixava-se de dores abdominaes, e caimbras; tinha frequentes dejecções alvinas, e vômitos de hum liquido sero-albuminoso: pulso sem frequencia, algum tanto duro, e pequeno, lingua quasi secca, e mucosa, sêde, e frio só nas extremidades, e nariz. Foi recommendada a mesma therapeutica, que a antecedente. Sahindo nós de casa desta doente veio hum aviso para se ir a Sanfins ver huma mulher, que tinha sido nessa tarde gravemente affectada: mandou-se hum Cirurgião, o qual foi munido dos esclarecimentos precisos. Na manhã seguinte, na volta para Coimbra, visitei esta doente, e a achei na conformidade da Observação N.º 2.º

OBSERVAÇÃO I.

Maria Marques, de 52 annos de idade, casada, assistente em Maiorca. A 22 de Março, pouco mais ou menos, foi atacada de dôres precordiaes, caimbras nas extremidades do lado esquerdo, e frio em todas; disposição a vômito, lingua mucosa, e branca, sêde: não teve diarrhêa. Foi sangrada, e tomou outros medicamentos (que ignoro). Conistou ter-se restabelecido. Na tarde do dia 8 do presente, apparecêrão-lhe vômitos, diarrhêa, cephalalgia, dôres na região epigastrica, olhos ligeiramente encovados, frio glacial por todo o corpo, falla maviosa, gemendo de vez em quando, lingua humida, e branca, sêde ardente, pulso contrahido sem frequencia, vômito de liquido sero-albuminoso, e diarrhêa do mesmo, porém sangui-

nolenta; não accusava caimbras: expirou ás quatro horas da madrugada.

AUTHOPSIA. CADÁVERICA.

— Sendo examinado este Cadáver antes da dissecação, não apresentava face hypocratica, mas tinha a contracção fixa dos flexores das extremidades superiores. Cavidade craneana — a dura-mater apresentou huma côr violacea concentrada; a arteria spinhosa, e suas ramificações, e todos os seios estavam bastantemente injectados de sangue negro, e espesso, assim como todos os vasos da pia mater, e os plexos choroideos, menos as veias de Galeno, e a basilar. Cavidade thoracica: Coração. — Todas as suas cavidades cheias de sangue, principalmente as do lado direito, e grossos vasos. — Cavidade abdominal: Estomago. — Sua mucosa toda inflammada; continha quantidade de liquido sero-albuminoso. O jejuno, e ileon estavam inflammados, tanto externa, como internamente, continhão vermes, e hum liquido sanguinolento. O colon transverso inflammado, e reduzido á terceira parte do seu diametro. A vesicula do felleteria duas onças de bilis verde-negra. Bexiga urinaria contrahida.

OBSERVAÇÃO II.

Maria da Silva, de 40 annos de idade, casada, assistente em Sanfins: na tarde do dia 8 de presente sentio dôres precordiaes, e grande frio; no dia 9 foi atacada de dôres fortissimas pelo ventre, caimbras, tenesmo, vômitos seccos, sêde, cephalalgia, pulso contrahido, olhos ligeiramente encovados: foi posta no uso interno d'hum cosimento de cevada, e grama, e fez-se huma sangria de seis onças no braço.

No dia 10, vindo eu de volta para Coimbra, visitando-a, notei o seguinte = pulso pequeno, molle, e sem frequencia, calôr natural, lingua humida, pouca sêde, mas ainda conservava algumas dôres pelo ventre, principalmente quando era comprimido, e quando tossia. Já se lhe tinha feito segunda sangria: determinei que não continuassem, porque a suppuz convalescente.

CONSIDERAÇÕES.

Esta Epidemia, que, segundo me consta, se desenvolvêo em Maiorca no principio de Março, tem os mesmos Symptomas, que a d'Aveiro, porém com menor malignidade, como se poderá vêr conferindo estas Observações com as do Relatorio.

bibRIA

Doutor Carlos José Pinheiro.